



PARA PROTEGER TU CULTIVO,
DEKALB® TE RECOMIENDA.



HARNESS® es un producto con un **CONTROL CONSTANTE** y un funcionamiento ideal para una gran variedad de climas.

¿PARA QUIÉN ES HARNESS®?

Para el agricultor que busca un inicio seguro, **HARNESS®** ofrece flexibilidad y control efectivo porque elimina la maleza antes de que ésta afecte el cultivo, adaptándose a las necesidades del agricultor.

VENTAJAS

Seguridad y confianza en tener un **HERBICIDA PREEMERGENTE Y SELECTIVO AL MAÍZ Y AGAVE.**

Tiene control constante en zacates y algunas malezas de hojas anchas.

BENEFICIOS

Controla 30 diferentes especies de pastos y malezas de hoja pequeña.





PARA PROTEGER TU CULTIVO,
DEKALB® TE RECOMIENDA.



FICHA TÉCNICA

Nombre Comercial
HARNESSTM

Ingrediente activo y composición
Acetoclor 839 g/L

Categoría
Herbicida agrícola

Modo de acción
Sistémico. Preemergencia

Tipo de formulación
Concentrado soluble

Registro Sanitario
RSCO-HEDE-0230-346-375-036



Categoría toxicológica
(IV) Ligeramente tóxico

Símbolo



Palabra de advertencia
Nocivo en caso de ingestión

Cultivos y usos autorizados

HarnesSTM se recomienda para el control preemergente de la maleza de hoja ancha y angosta en los cultivos de maíz y agave.

MALEZA QUE CONTROLA

HOJA ANGOSTA

Zacate pitillo (*Ixophorus unisetus*), zacate pinto o choneano (*Echinochloa colonum*), zacate de agua (*Echinochloa crusgalli*), zacate sabana (*Brachiaria plantaginea*), zacate cola de zorra (*Setaria spp.*), zacate pata de gallina (*Eleusine indica*), zacate escamoso o salado (*Leptochloa filiformis*), zacate ilusión (*Panicum trichoides*), zacate triguillo (*Panicum mileaceum*), zacate pata de gallo (*Digitaria sanguinalis*), zacate cadillo o huachapone (*Cenchrus echinatus*), coquillo amarillo de semilla (*Cyperus esculentus*).

HOJA ANCHA

Quelite o bledo (*Amaranthus hybridus*), polocote (*Tithonia tubaeiformis*), verdolaga (*Portulaca oleracea*), chual (*Chenopodium album*), flor amarilla (*Melampodium divaricatum*), aceitilla (*Bidens pilosa* y *Bidens frondosa*), cabeza de negro (*Borreria asperifolia*), hierba del pollo (*Commelina diffusa*), chicalote (*Argemone mexicana*), flor blanca (*Richardia scabra*).

Una vez realizada la aplicación, deberá esperar 12 horas antes de volver a entrar al cultivo.

Dosis:

HARNESSTM controla la maleza antes de que emerja, por lo que la dosis a usarse varía dependiendo de la textura del suelo:

TIPO DE SUELO	DOSIS HARNESSTM® (L/ha)
Suelos ligeros (arenosos)	1.5
Suelos medianos (francos o limosos)	2.0
Suelos pesados (arcillosos)	2.5

El suelo a tratar debe estar bien preparado y libre de terrones grandes. Aplicar HarnesSTM inmediatamente después de la siembra antes de la emergencia de la maleza y de cultivo. Una vez emergida del suelo, la maleza no es controlada por HarnesSTM. La lluvia o riego posterior a la aplicación es necesaria para activar el producto. El control puede resultar deficiente si la aplicación se realiza sobre suelo seco, pero existe humedad bajo la superficie para la germinación de semillas de la maleza.

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

