



Productos Fitosanitarios

Harness®

Herbicida / Concentrado emulsionable

DATOS GENERALES DEL PRODUCTO

Ingrediente activo:

ACETOCLOR

Composición porcentual:

Ingredientes activos:	% en peso
Acetoclor:	
2-cloro-N-etoximetil-6'etilacet-o-toluidida.....	75.3
(Equivalente a 839 g de i.a./L a 20°C)	
Ingredientes inertes:	
Protector, solvente, emulsificante, estabilizador y portador	24.7
TOTAL	100.0

Categoría toxicológica:

4 Precaución

No. de Registro:

RSCO-HEDE-0288-302-009-075

Sistemicidad:

Sistémico	Contacto	Translaminar
X		

Descripción:

Harness® se recomienda para el control pre emergente selectivo de malezas de hoja ancha y angosta en los cultivos de **maíz y agave**.

MALEZAS QUE CONTROLA

Hoja angosta: Zacate pitillo (*Ixophorus unisetus*), zacate pinto o choneano (*Echinochloa colonum*), zacate de agua (*Echinochloa crusgalli*), zacate sabana (*Brachiaria plantaginea*), zacate cola de zorra (*Setaria spp.*), zacate pata de gallina (*Eleusine indica*), zacate escamoso o salado (*Leptochloa filiformis*), zacate ilusión (*Panicum trichoides*), zacate triguillo (*Panicum mileaceum*), zacate pata de gallo (*Digitaria saguinalis*), zacate cadillo o huachapone (*Cenchrus echinatus*), coquillo amarillo de semilla (*Cyperus esculentus*).

Hoja ancha: Quelite o bledo (*Amaranthus hybridus*), polocote (*Tithonia tubaeiformis*), verdolaga (*Portulaca oleracea*), chual (*Chenopodium album*), flor amarilla (*Melampodium divaricatum*), aceitilla (*Bidens pilosa* y *Bidens frondosa*), cabeza de negro (*Borreria asperifolia*), hierba del pollo (*Commelina diffusa*), chicalote (*Argemone mexicana*), flor blanca (*Richardia escabra*).

Usa vez realizada la aplicación, deberá esperar 12 horas antes de volver a entrar al cultivo.



Productos Fitosanitarios

Dosis:

Harness® controla las malezas antes de que emerjan, por lo que la dosis a usarse varía dependiendo de la textura del suelo:

TIPO DE SUELO	DOSIS HARNESSE® (L/ha)
Suelos ligeros (arenosos)	1.5
Suelos medianos (Francos o limosos)	2.0
Suelos pesados (arcillosos)	2.5

Si el producto se aplica en banda, la dosis deberá reducirse proporcionalmente a la superficie por aplicar.

Época de aplicación

El suelo a tratar debe estar bien preparado y libre de terrones grandes. Aplicar **Harness®** inmediatamente después de la siembra, antes de la emergencia de las malezas y el cultivo. Una vez emergidas del suelo, las malezas no son controladas por **Harness®**. La lluvia o riego posterior a la aplicación es necesaria para activar el producto. El control puede resultar deficiente si la aplicación se realiza sobre suelo seco, pero existe humedad bajo la superficie para la germinación de semillas de las malezas.

PRESENTACIONES DISPONIBLES

1 L