

Defensa®

Herbicida / Solución concentrada acuosa

DATOS GENERALES DEL PRODUCTO

Ingrediente activo:

PICLORAM + 2,4-D

Composición porcentual:

Ingredientes activos:

% en peso

Picloram:

2.4-D:

Sal dietanolamina del ácido 2,4 diclorofenoxiacético con un contenido

de ácido 2,4-D no menor de 79.78%......38.00

(Equivalente a 240 g de i.a./L a 20°C)

Ingredientes inertes:

Categoría toxicológica:

4 Precaución

No. de Registro:

RSCO-MEZC-1219-001-014-049

Sistemicidad:

0.000			
Sistémico	Contacto	Translaminar	
Х			

Descripción:

Defensa® es un herbicida sistémico selectivo (no afecta a los pastos bien establecidos) usado para el control de malezas de hoja ancha herbáceas y leñosas o arbustivas en pastizales o potreros.

MALEZAS QUE CONTROLA

Cornezuelo o Subin (Acacia cornigera), Chukum, Humo (Phitecollobium spp.), Pica-pica (Mucuna pruriens), Platanillo bijaua (Heliconia bihai), Huisache o Subinche (Acacia farnesiana), Escobilla o Chichibé (Sida acuta), Ikaban (Croton spp.), Golondrina (Euphorbia spp.) Correhuela (Convolvulus arvensis), Malva (Malva spp.), Mala mujer (Cnidoscolus urens), Zarza (Mimosa pigra), Carso santo, Chicalote (Argemone mexicana), Candelillo o Canlol (Tecoma stans), Quiebra platos (Crotalaria saggitalis), Huisachillo (Acacia tortuosa), Mezquite (Prosopis juniflora), Berenjena (Solanum spp.), Dormilona (Mimosa pudica), Pata de vaca (Bauhinia spp.).

Usa vez realizada la aplicación, deberá esperar 24 horas antes de volver a entrar al cultivo.



Productos Fitosanitarios



Dosis:

Aplicación foliar: en áreas densamente pobladas de malezas, donde sean necesarios tratamientos generales úsense de 3 a 5 L de **Defensa**® por hectárea en 200-500 L de agua para aplicaciones terrestres y de 50 -80 L de agua, cuando se use equipo aéreo. Para el control de malezas que crecen por manchones, aplíquese con equipo terrestre de tractor o de mochila una mezcla de 1 a 2 L de **Defensa**® por cada 100 L de agua y aplíquese hasta mojar completamente las hojas. Para mejores resultados, efectúese la aplicación cuando las malezas se encuentren en pleno desarrollo y exista humedad en el suelo. Evítese efectuar la aplicación cuando las hojas hayan perdido su color normal a causa de altas temperaturas y/o sequía o en estado de floración o fructificación o bajo condiciones de inundación.

Aplicación al tocón: Para malezas arbustivas de más de 2m de altura (en la cual no se pueda hacer una buena aspersión) y las que tengan las hojas muy cerosas (que dificulta la penetración del herbicida), recomienda aplicar una solución de **Defensa**® al 4% (4 L en 100L de agua) a los tocones inmediatamente después de realizar el corte. Se recomienda que los cortes se realicen a una altura no mayor de 20 cm de la superficie de suelo.

PRES	SENTA	CIONES	DISPONIBI	FS

1 y 10 litros.

